

ACETIC ACID + LACTIC ACID + CITRIC ACID
ORAL SOLUTIONاسید استیک + اسید لاکتیک + اسید سیتریک
محلول خوراکی (اسیدیفایر)

ترکیب

هر لیتر حاوی:	
اسید استیک	400 گرم
اسید لاکتیک	90 گرم
اسید سیتریک	10 گرم

مکانیسم اثر

اسیدهای آلی با تخریب دیواره باکتری و افزایش قدرت نشت پذیری غشاء خارجی باکتری و نیز در باکتریهای حساس به pH مانند سالمونلا، E. Coli، استافیلوکوک، کلستریدیوم، کمپیلوباکتر و لیستریا با انتشار غیرفعال به داخل باکتریها نفوذ کرده و در pH خنثی یونیزه شده و pH داخل باکتری را پایین آورده و رشدشان را کند و یا توقف می کنند. در ضمن بخش آنیونی اسیدهای ارگانیک در داخل باکتریها تجمع یافته و عملکرد متابولیکی آنها را از طریق افزایش فشار اسمزی تحت تاثیر قرار داده و حیات باکتریها را مختل می کند.

گونه هدف : طیور (گوشتی، تخمگذار، مادر)

موارد مصرف

- کنترل آنتریت های میکروبی بدون استفاده از آنتی بیوتیک
- کاهش pH و بهبود متابولیسم پروتئین ها و در نتیجه کنترل مشکلات کلیوی
- کاهش تولید گاز آمونیاک
- در موارد استرس و اختلال در فلور طبیعی روده
- افزایش سرعت رشد و کاهش ضریب تبدیل غذایی
- افزایش مقاومت در مقابل بیماریها و بهبود سلامت حیوان
- افزایش جذب کلسیم و فسفر و بهبود کیفیت گوشت
- بهبود تولید در طیور مادر و تخمگذار
- کاهش تخم مرغهای کثیف

مقدار و روش مصرف

100-50 میلی لیتر از محلول کیمیا آسسول پلاس در 100 لیتر آب آشامیدنی به مدت 7-3 روز.
توجه: بهتر است مدت و مقدار مصرف با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

موارد منع مصرف : ندارد

تداخلات دارویی: ندارد

زمان پرهیز از مصرف: ندارد

شرایط نگهداری

در جای خشک، دمای کمتر از 25 درجه و دور از نور نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت گردد.
پس از باز شدن درب ظرف، محصول در طول مدت 1 ماه مصرف گردد.

بسته بندی

ظروف پلی اتیلنی 200، 500 و 1000 میلی لیتری به همراه لیوان مدرج



ACETIC ACID + LACTIC ACID + CITRIC ACID
ORAL SOLUTION

اسید استیک + اسید لاکتیک + اسید سیتریک
محلول خوراکی (اسیدیفایر)



شرکت داروسازی کیمیافام، فرمانیه، ابتدای دیباجی شمالی، پلاک 62
تلفن: 60 - 22824657 فاکس: 22815817

www.kimiafaam.com

