

Propionic Acid + Propionate ammonium + Formic Acid + Formate ammonium

اسید پروپیونیک + پروپیونات آمونیوم + اسید فرمیک + فرمات آمونیوم

ORAL SOLUTION

محلول خوراکی (اسیدیفایر)

ترکیب :

اسید پروپیونیک	وزنی	34%
پروپیونات آمونیوم	وزنی	5%
اسید فرمیک	وزنی	15%
فرمات آمونیوم	وزنی	26%

مکانیسم اثر

اسید پروپیونیک موجود در این ترکیب فعالیت آنتی میکروبی بسیار قوی داشته و مانع از رشد قارچها، مخمرها و باکتریها به خصوص باکتریهای گرم منفی می شود. اسید فرمیک با کاهش pH بطور قابل توجهی باعث کاهش تعداد میکروبیهای E.Coli، سالمونلا و کمپیلوباکترها می شود. بافر آمونیومی نیز اثرات زیان آور داروها را کاهش می دهد و ضمن آلودگی زدایی از سیستم های آبخوری از تشکیل بیوفیلم جلوگیری می کند. بدینوسیله لوپرومیکس NC بدون هیچ اثر زیان آوری از آلودگی سالمونلایی، E.Coli و سایر باکتریهای پاتوژن می کاهد و مانع از تشکیل قارچها و مخمرها می شود. همچنین لوپرومیکس NC باعث تحریک تخمیر اسید لاکتیک شده و از تشکیل اسید بوتیریک جلوگیری می کند.

گونه هدف : دام و طیور (گوشتی، تخمگذار، مادر)

موارد مصرف

- کنترل آنتریت های میکروبی بدون استفاده از آنتی بیوتیک
- کاهش pH و بهبود متابولیسم پروتئین ها و در نتیجه کنترل مشکلات کلیوی
- در موارد استرس و اختلال در فلور طبیعی روده
- تحریک و بهبود هضم و جذب مواد غذایی و بهبود کیفیت گوشت
- افزایش سرعت رشد و کاهش ضریب تبدیل غذایی
- افزایش مقاومت در مقابل بیماریها و کاهش میزان مرگ و میر
- کاهش تولید گاز آمونیاک و کاهش تخم مرغهای کثیف
- بهبود تولید در طیور مادر و تخمگذار

مقدار و روش مصرف

- 1- جهت آلودگی زدایی از سیستم های آبخوری، تانکها و نیپل ها با رقت 1٪ و به مدت 24 ساعت.
 - 2- به میزان 2- 1.5 لیتر در 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 10 روز متوالی.
 - 3- ابتدا 1 لیتر از محلول را در 4 لیتر آب رقیق کرده، سپس بر حسب میزان مواد خشک علوفه (با ضخامت 40 سانتی متر) تا 25٪ ماده خشک 2.4 لیتر به ازای 1 متر مربع علوفه، 35- 25٪ ماده خشک به میزان 2.8 لیتر در هر متر مربع علوفه و بیش از 35٪ ماده خشک به میزان 3.2 لیتر برای هر متر مربع توصیه می شود.
- توجه: بهتر است مدت و مقدار مصرف با تجویز کلینیسین تعیین گردد.
- *هیچگونه منع مصرف، تداخل دارویی و زمان پرهیز از مصرف برای این محصول گزارش نشده است.

شرایط نگهداری

در جای خشک، در دمای کمتر از 25 درجه و دور از نور نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت گردد.
پس از باز شدن درب ظرف، محصول در طول مدت 1 ماه مصرف گردد.

بسته بندی

ظروف پلی اتیلنی یک لیتری به همراه لیوان مدرج



Propionic Acid + Propionate ammonium + Formic Acid + Formate ammonium
 محلول خوراکی (اسیدیفایر) ORAL SOLUTION

اسید پروپیونیک + پروپیونات آمونیوم + اسید فرمیک + فرمات آمونیوم
 محلول خوراکی (اسیدیفایر)



شرکت داروسازی کیمیا فام، فرمانیه، ابتدای دیباجی شمالی، پلاک 62
 تلفن: 60 - 22824657 فاکس: 22815817

www.kimiafaam.com

