

ترکیب:

هر میلی لیتر فلورون حاوی ۱۰۰ میلی گرم فلورفنیکل می باشد.

مکانیسم اثر:

فلورفنیکل آنتی بیوتیکی وسیع الطیف است که با اتصال به تحت واحد ریبوزومی ۵۰S، موجب کاهش فعالیت آنزیم پپتیدیل ترانسفراز شده و در نتیجه از سنتز پروتئین و نهایتاً رشد باکتری ها جلوگیری به عمل می آورد (باکتریواستاتیک) و با مکانیسم فوق بر روی تعداد زیادی از باکتریهای گرم منفی نظیر گونه های مختلف پاستورلا، اورنیتوباکتریوم، سالمونلا، اشرشیاکلی، هموفیلوس، کورینه باکتریوم و باکتریهای گرم مثبت مانند کلستریدیوم، استافیلوکوکوس و استرپتوکوکوس و همچنین مایکوپلاسما موثر می باشد.

گونه هدف:

طیور (گوشتی، تخمگذار و مادر)

موارد مصرف:

جهت پیشگیری، کنترل و درمان بیماریهای ناشی از باکتریهای گرم منفی و گرم مثبت حساس به فلورفنیکل در دستگاه تنفس و گوارش مانند CRD، کلی باسیلوز، پاستورلوز، کوریزای عفونی، اورنیتوباکتریوم و سایر عفونتهای ایجاد شده توسط گونه های مختلف استافیلوکوکها، استرپتوکوکها و کورینه باکتریوم ها تجویز می گردد.

مقدار و روش مصرف:

20 میلی گرم فلورفنیکل خالص برای هر کیلوگرم وزن زنده در روز (معادل ۲۰۰ میلی گرم فلورون)، معادل ۱ لیتر فلورون در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی بر اساس سن و وزن می باشد.

توجه: مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و باید با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

موارد منع مصرف:

مصرف فلورفنیکل در طیور تخمگذار (در دوره تخمگذاری) که تخم آنها به مصرف انسان می رسد منع شده است.

تداخلات دارویی:

مصرف همزمان فلورون با اکثر آنتی بیوتیک ها به خصوص ماکرولیدها و لینکوزامیدها موجب تداخل دارویی می گردد.

زمان پرهیز از مصرف:

مصرف دارو در طیور گوشتی ۵ روز قبل از کشتار قطع گردد و در طیور تخمگذار در طی دوره تخمگذاری مصرف نشود.

احتیاط:

پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طول مدت ۶۰ روز باید مصرف گردد.

محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا ۲۴ ساعت باید مصرف شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، خنک (در دمای کمتر از ۲۵ درجه) و دور از نور نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت گردد.

بسته بندی:

ظروف پلی اتیلنی یک لیتری به همراه لیوان مدرج





شرکت داروسازی کیمیافام ، فرمانیه ، ابتدای دیباجی شمالی ، پلاک ۶۲

تلفن : ۶۰ - ۲۲۸۲۴۶۵۷ فاکس : ۲۲۸۱۵۸۱۷

www.kimiafaam.com

