

گروه دارویی: آنتی بیوتیک پلی پپتیدی

ترکیب:

هر گرم از محصول حاوی 100 میلی گرم باسیتراسین به فرم متیلن دی سالیسیلات می باشد.

گونه هدف:

طیور (گوشتی، تخمگذار، مادر) و بوقلمون

موارد مصرف:

به منظور پیشگیری و درمان آنتریت نکروتیک ناشی از کلستریدیوم پرفرینجنس

جهت تسریع بهبودی طیور مبتلا به کوکسیدیوز

در مواقع بروز استرس خصوصا استرس ناشی از واکسیناسیون

مقدار و روش مصرف:

- جهت پیشگیری از آنتریت نکروتیک به میزان 30 گرم در 100 لیتر آب آشامیدنی به مدت 4-5 روز

- جهت درمان آنتریت نکروتیک 100-60 گرم در 100 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-7 روز

- جهت تسریع درمان کوکسیدیوز و رفع استرس 100-60 گرم در 100 لیتر آب آشامیدنی به مدت 4-5 روز

- جهت کنترل و درمان آنتریت نکروتیک در بوقلمونها به میزان 100 گرم در 100 لیتر آب آشامیدنی.

موارد منع مصرف:

در اختلالات کلیوی و موارد حساسیت به دارو منع مصرف دارد.

تداخلات دارویی:

گزارش نشده است.

زمان پرهیز از مصرف:

ندارد.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، خنک و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:

پاکتهای فویل آلومینیومی 60، 100، 200، 500 و 1000 گرمی



BACITRACIN 10%
WATER SOLUBLE POWDER

باسیتراسین 10%
پودر محلول در آب

