

**ترکیب:**

هر میلی لیتر کیمیاکلیست - اس<sup>®</sup> حاوی ۲۰۰۰۰۰۰ واحد بین المللی کلیستین سولفات است .

**مکانیسم اثر:**

کلیستین یک آنتی بیوتیک پلی پپتیدی و از خانواده پلی میکسین هاست که با تأثیر بر غشای سلولی و تغییر در نفوذپذیری آن باعث مرگ سلول باکتری می شود (باکتریسید). همچنین کلیستین می تواند تا حدودی موجب خنثی سازی اندوتوکسین باکتریهای گرم منفی شود. اثر ضدباکتریایی کلیستین بیشتر بر روی باکتریهای گرم منفی مانند E.coli، سالمونلا و کمپیلوباکتر می باشد.

**گونه هدف:**

طیور (گوشتی، تخمگذار و مادر)

**موارد مصرف:**

کیمیاکلیست- اس در پیشگیری ، کنترل و درمان بیماریهای ناشی از عوامل باکتریایی حساس به کلیستین نظیر گاستروآنتریت هموراژیک، سالمونلوز و کلی باسیلوز تجویز می شود.

**مقدار و روش مصرف:**

۷۵۰۰۰ واحد بین المللی کلیستین خالص برای هر کیلوگرم وزن زنده در روز و یا ۲۵۰ میلی لیتر از محلول کیمیا کلیست- اس در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳ روز بر اساس سن و وزن می باشد.

**توجه:** مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و بهتر است با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

**موارد منع مصرف :** تجویز دارو در طیور واجد اختلالات کلیوی توصیه نمی شود.

**تداخلات دارویی:**

تجویز همزمان کلیستین با کاتیونهای چند ظرفیتی ممکن است موجب تداخل دارویی گردد.

**زمان پرهیز از مصرف:**

طیور گوشتی: ۲ روز

طیور تخمگذار: ندارد

**احتیاط:**

پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طول مدت ۶۰ روز باید مصرف گردد.

محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا ۲۴ ساعت باید مصرف شود.


**شرایط نگهداری:**

در جای خشک، خنک (در دمای کمتر از ۲۵ درجه) و دور از نور نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت گردد.

**بسته بندی:**

ظروف پلی اتیلنی یک لیتری به همراه لیوان مدرج





شرکت داروسازی کیمیفام ، فرمانیه ، ابتدای دیباجی شمالی ، پلاک ۶۲

تلفن : ۶۰ - ۲۲۸۲۴۶۵۷ فاکس : ۲۲۸۱۵۸۱۷

[www.kimiafaam.com](http://www.kimiafaam.com)

