

**ترکیب:**

هر میلی لیتر کیما دیفلوکساسین® حاوی ۱۱۴/۶ میلی گرم دیفلوکساسین هیدروکلراید می باشد.

**مکانیسم اثر:**

دیفلوکساسین یک آنتی بیوتیک باکتریسید و از دسته فلوروکینولونها است که با مهار آنزیم DNA gyrase موجب توقف عمل همانندسازی DNA و مرگ باکتری می شود. دیفلوکساسین بر روی باکتریهای گرم منفی مانند E.coli و پاستورلا و بعضی از باکتریهای گرم مثبت و همچنین مایکوپلاسما خصوصا سویه گالی سپتیکوم موثر می باشد.

**گونه هدف:**

طیور (گوشتی، مادر) و بوقلمون

**موارد مصرف:**

برای پیشگیری، کنترل و درمان بیماریهای ناشی از عوامل باکتریایی حساس به دیفلوکساسین مانند کلی باسیلوز ، CRD کمپلکس و پاستورلوز مورد استفاده قرار می گیرد.

**مقدار و روش مصرف:**

۱۰ میلی گرم دیفلوکساسین خالص برای هر کیلوگرم وزن زنده در روز (معادل ۱۰۰ میلی گرم کیما دیفلوکساسین®) و یا ۵۰۰ میلی لیتر از کیما دیفلوکساسین در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۵-۳ روز بر اساس سن و وزن توصیه می شود.  
**توجه:** مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و بهتر است با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

**موارد منع مصرف:**

دیفلوکساسین در طیور مبتلا به استئوپروز و طیور تخمگذاری که تخم آن به مصرف انسان می رسد منع مصرف دارد.

**تداخلات دارویی:**

مصرف همزمان با کاتیونهای چند ظرفیتی مانند کلسیم ، منیزیم و آلومینیوم موجب کاهش جذب دیفلوکساسین می گردد.  
**زمان پرهیز از مصرف:**

مصرف دارو یک روز قبل از کشتار طیور قطع گردد.

**احتیاط:**

پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طول مدت ۶۰ روز باید مصرف گردد.  
محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا ۲۴ ساعت باید مصرف شود.

**شرایط نگهداری:**

در جای خشک، در دمای کمتر از ۲۵ درجه و دور از نور نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت گردد.

**بسته بندی:**

بطری های پلی اتیلنی یک لیتری به همراه لیوان مدرج



**DIFLOXACIN 10 %**

دیفلوکساسین ۱۰٪

**ORAL SOLUTION**

محلول خوراکی



شرکت داروسازی کیمیفام ، فرمانیه ، ابتدای دیباجی شمالی ، پلاک ۶۲

تلفن : ۶۰ - ۲۲۸۲۴۶۵۷ فاکس : ۲۲۸۱۵۸۱۷

[www.kimiafaam.com](http://www.kimiafaam.com)

