

ترکیب:

هر میلی لیتر کیمیا داکسی - اس[®] حاوی ۱۰۰ میلی گرم داکسی سایکلین هیکلت می باشد.

مکانیسم اثر:

داکسی سایکلین یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف و باکتریواستاتیک می باشد که با اتصال به تحت واحد S₃₀ ریبوزومی مانع از سنتز پروتئین باکتریایی میشود. داکسی سایکلین با مکانیسم فوق بر روی باکتریهای گرم مثبت مانند استافیلوکوک، استرپتوکوک و کلاستریدیوم و باکتریهای گرم منفی مانند پاستورلا، سالمونلا، هموفیلوس و اشیشیاکلی و همچنین بر روی میکوپلاسماها، اسپروکت، کلامیدیا و ریکتزیا موثر می باشد.

گونه هدف:

طیور (گوشتی، تخمگذار و مادر)

موارد مصرف:

جهت پیشگیری، کنترل و درمان بسیاری از بیماریهای ناشی از عوامل باکتریایی حساس به داکسی سایکلین مانند CRD، کلی باسیلوز، پاستورلوز، سالمونلوز، کوریزای عفونی، عفونتهای استافیلوکوکی و استرپتوکوکی و ورم روده نکروتیک ناشی از کلاستریدیا تجویز می شود.

مقدار و روش مصرف:

طیور: ۱۰ تا ۲۰ میلی گرم داکسی سایکلین خالص برای هر کیلو گرم وزن زنده در روز (معادل ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی گرم کیمیا داکسی - اس) و یا ۱۰۰۰ - ۵۰۰ میلی لیتر از کیمیا داکسی - اس در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۵ - ۳ روز بر اساس سن و وزن می باشد.
توجه: مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و بهتر است با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

موارد منع مصرف:

تجویز داکسی سایکلین در طیور تخمگذار (در دوره تخمگذاری) که تخم آنها به مصرف انسان می رسد منع شده است.

تداخلات دارویی:

تجویز همزمان داکسی سایکلین با پنی سیلین، سفالوسپورین ها، آمینوگلیکوزیدها و کاتیونهای ۲ - ۳ ظرفیتی مانند آلومینیوم، کلسیم، منیزیوم، روی و آهن موجب تداخل دارویی می گردد.

زمان پرهیز از مصرف:

مصرف دارو ۵ روز قبل از کشتار طیور قطع گردد.

احتیاط:

پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طول مدت ۶۰ روز باید مصرف گردد.

محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا ۱۲ ساعت باید مصرف شود.


شرایط نگهداری:

در جای خشک و دردمای کمتر از ۲۵ درجه ساتی گراد، دور از نور نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت گردد.

بسته بندی:

ظروف پلی اتیلنی یک لیتری به همراه لیوان مدرج





شرکت داروسازی کیمیافام، فرمانیه، ابتدای دیباجی شمالی، پلاک ۶۲
تلفن : ۶۰ - ۲۲۸۲۴۶۵۷ فاکس : ۲۲۸۱۵۸۱۷
www.kimiafaam.com

