

ترکیب:

هر گرم پودر کیمیا لینکو 4/4 حاوی 4/4 میلی گرم لینکومایسین هیدروکلراید می باشد.

مکانیسم اثر:

لینکومایسین با اتصال به تحت واحد S 50 ریبوزومی از سنتز پروتئین های باکتری جلوگیری می کند و با مکانیسم فوق بر روی باکتریهای گرم مثبت مانند استرپتوکوکها، استافیلوکوکها، کلستریدیوم و همچنین مایکوپلاسماها موثر می باشد

گونه هدف:

طیور گوشتی

موارد مصرف:

کیمیا لینکو 4/4 برای کنترل بیماری آنتریت نکروتیک ناشی از کلستریدیوم پرفرینجنس و سایر میکروارگانیسم های حساس به آن و جهت پیشگیری و درمان CRD و CRD کمپلکس به طور همزمان با داروی لینکواسپکتین تجویز می گردد. همچنین جهت افزایش وزن بدن، کاهش ضریب تبدیل غذایی و اصلاح پیگمانتاسیون پوستی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار و روش مصرف:

جهت کنترل آنتریت نکروتیک 500 گرم در هر تن دان نهایی و به منظور کاهش ضریب تبدیل و افزایش سرعت وزن گیری به میزان 1000-500 گرم در هر تن دان نهایی توصیه می شود.

توجه: مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و باید با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

موارد منع مصرف:

تجویز کیمیا لینکو 4/4 در طیور مادر، تخمگذار و بوقلمون منع شده است.

تداخلات دارویی:

تجویز همزمان لینکومایسین با ماکرولیدها مانند تایلوزین و اریترومایسین موجب تداخل دارویی می گردد.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد**موارد احتیاط:**

پس از باز شدن بسته بندی حداکثر ظرف مدت 1 ماه مصرف گردد.

داروی آماده مصرف را حداکثر ظرف مدت 24 ساعت مصرف نمایید.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، خنک و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:

پاکتهای فویل آلومینیومی چندلایه یک کیلوگرمی به صورت وکیوم



LINCOMYCIN 0.44%
FEED PREMIX

لینکومایسین 0/44 %
پریمیکس مخلوط در دان

