

**ترکیب:**

هر گرم کیمیالینکو 40 حاوی 454/18 میلی گرم لینکومایسین هیدروکلراید معادل با 400 میلی گرم لینکومایسین فعال می باشد.

**مکانیسم اثر:**

لینکومایسین یک آنتی بیوتیک لینکوزامیدی و باکتریواستاتیک بوده که با اتصال به تحت واحد S 50 ریبوزومی از سنتز پروتئین های باکتری جلوگیری می کند و با مکانیسم فوق بر روی باکتریهای گرم مثبت مانند استرپتوکوک ها، استافیلوکوک، کلستریدیوم و همچنین مایکوپلاسماها موثر می باشد.

**گونه هدف:**

طیور گوشتی

**موارد مصرف:**

کیمیالینکو 40 برای کنترل و درمان بیماری آنتریت نکروتیک (ورم روده نکروتیک) ناشی از کلستریدیوم پرفرینجنس مورد استفاده قرار می گیرد.

**مقدار و روش مصرف:**

جهت کنترل و درمان آنتریت نکروتیک 75 گرم در 1000 لیتر آب آشامیدنی (معادل 30 میلی گرم لینکومایسین در 1 لیتر آب) به مدت حداکثر 7 روز تجویز می گردد.

**توجه:** مدت و مقدار مصرف بر اساس شدت بیماری متغیر بوده و باید با تجویز کلینیسیین تعیین گردد.

**موارد منع مصرف:**

تجویز کیمیا لینکو 40 در طیور مادر، تخمگذار و بوقلمون منع شده است.

**تداخلات دارویی:**

تجویز همزمان لینکومایسین با ماکرولیدها مانند تایلوزین و اریترومایسین موجب تداخل دارویی می گردد.

**زمان پرهیز از مصرف:** ندارد

**موارد احتیاط:**

پس از باز شدن بسته بندی حداکثر ظرف مدت 1 ماه مصرف گردد.

داروی آماده مصرف را حداکثر ظرف مدت 24 ساعت مصرف نمایید.

**شرایط نگهداری:**

در جای خشک، (در دمای 30- 15 درجه) و دور از نور نگهداری شود.

**بسته بندی:**

پاکتهای فویل آلومینیومی چند لایه 75، 100 و 150 گرمی به صورت وکیوم.



**KIMIALINCO 40®**

**کیمیا لینکو 40®**

LINCOMYCIN 40%

لینکومايسين 40%

WATER SOLUBLE POWDER

پودر محلول در آب



شرکت داروسازی کیمیا فام، فرمانیه، ابتدای دیباجی شمالی، پلاک 62  
تلفن : 60 - 22824657 فاکس : 22815817

[www.kimiafaam.com](http://www.kimiafaam.com)

