

ترکیب:

هر گرم پودر کیمیا لینکو 8/8® حاوی 9/98 میلی گرم لینکومایسین هیدروکلراید (معادل 8/8 میلی گرم لینکومایسین) می باشد.

مکانیسم اثر:

لینکومایسین با اتصال به تحت واحد S 50 ریبوزومی از سنتز پروتئین های باکتری جلوگیری می کند و با مکانیسم فوق بر روی باکتریهای گرم مثبت مانند استرپتوکوکها، استافیلوکوکها، کلاستریدیومها و همچنین مایکوپلاسماها موثر می باشد.

گونه هدف:

طیور گوشتی

موارد مصرف:

کیمیالینکو 8/8® برای کنترل بیماری آنتریت نکروتیک ناشی از کلاستریدیوم پرفرینجنس و سایر میکروارگانیسم های حساس به آن و جهت پیشگیری و درمان CRD و CRD کمپلکس به طور همزمان با داروی لینکواسپکتین تجویز می گردد. همچنین جهت افزایش وزن بدن، کاهش ضریب تبدیل غذایی و اصلاح پیگمانتاسیون پوستی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار و روش مصرف:

جهت کنترل آنتریت نکروتیک 250 گرم در هر تن دان نهایی و به منظور کاهش ضریب تبدیل و افزایش سرعت وزن گیری به میزان 500 – 250 گرم در هر تن دان نهایی توصیه می شود.

توجه: مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و بهتر است با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

موارد منع مصرف:

تجویز کیمیا لینکو 8/8® در طیور مادر، تخمگذار و بوقلمون منع شده است.

تداخلات دارویی:

تجویز همزمان لینکومایسین با ماکرولیدها مانند تایلوزین و اریترومایسین موجب تداخل دارویی می گردد.

زمان پرهیز از مصرف: ندارد

موارد احتیاط:

پس از باز شدن بسته بندی حداکثر ظرف مدت 2 ماه مصرف گردد.

داروی آماده مصرف را حداکثر ظرف مدت 24 ساعت مصرف نمایید.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای کمتر از 25 درجه و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:

پاکتهای فویل آلومینیومی چندلایه 200، 500، 1000 و 5000 گرمی به صورت وکیوم



LINCOMYCIN 0.88%

لینکومايسين 0.88%

FEED PREMIX

پريميكس مخلوط در دان



شرکت داروسازی کیمیافام، فرمانیه، ابتدای دیباجی شمالی، پلاک 62

تلفن : 60 - 22824657 فاکس : 22815817

www.kimiafaam.com

