

ترکیب:

هر گرم پودر کیمیامولین 10[®] حاوی 100 میلی گرم تیامولین هیدروژن فومارات می باشد.

مکانیسم اثر:

تیامولین یک آنتی بیوتیک پلوروموتیلینی است که با اتصال به تحت واحد 50 S ریبوزوم و جلوگیری از سنتز پروتئین میکروارگانسیم ها سبب انهدام آنها می گردد. تیامولین علیه باکتریهای گرم مثبت و باکتریهای گرم منفی و همچنین برگونه های مختلف اسپروکت و مایکوپلاسماها موثر می باشد

گونه هدف:

طیور (گوشتی، تخمگذار، مادر) و بوقلمون

موارد مصرف:

کیمیامولین 10 جهت کنترل و درمان بیماریهایی مانند CRD، CRD-Complex، سینوویتیس، سینوزیت، اسهال خونی اسپروکتی و کوریزای عفونی توصیه می گردد.

مقدار و روش مصرف:

- 1-درمان CRD و سینوویت عفونی: 5 کیلوگرم از کیمیا مولین 10 در 1 تن دان در روز به مدت 3-5 روز.
 - 2- برای پیشگیری و کنترل CRD : 300 گرم کیمیا مولین 10 در 1 تن دان در روز در 1-5 هفتگی.
 - 3- پیشگیری و کنترل CRD در مرغان مادر و تخمگذار: 500 گرم کیمیا مولین 10 در 1 تن دان در روز به مدت 1 هفته در ماه.
- توجه:** مدت و مقدار مصرف بهتر است با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

موارد منع مصرف: ندارد.

تداخلات دارویی:

از مصرف همزمان کیمیامولین 10[®] با ناراسین، مونسنین، سالینومایسین و مادورامایسین در طیور خودداری گردد.

زمان پرهیز از مصرف:

طیور گوشتی: 3 روز قبل از ارسال به کشتارگاه
بوقلمون: 5 روز قبل از ارسال به کشتارگاه

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای کمتر از 25 درجه و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:

پاکت های فویل آلومینیومی چند لایه 100 ، 200 ، 500 و 1000 گرمی به صورت وکیوم

TIAMULIN 10 %
FEED PREMIX

تیامولین 10 %
پودرمخلوط در دان

