

ترکیب

هر میلی لیتر تیل مایکوزین فسفات ۲۵٪ حاوی ۲۵۰ میلی گرم تیل مایکوزین به فرم فسفات می باشد.

مکانیسم اثر

تیل مایکوزین آنتی بیوتیکی از خانواده ماکرولیدهاست که با اتصال به تحت واحد ۵۰S ریبوزوم باکتری، مانع از سنتز پروتئین باکتری و در نتیجه توقف رشد و از بین رفتن باکتری می شود. شش ساعت پس از مصرف دارو، تیل مایکوزین در بافت‌های هدف تجمع یافته و به حد درمانی خود می رسد و تا ۴۸ ساعت بالاتر از غلظت درمانی باقی می ماند. همچنین با توجه به تجمع تیل مایکوزین در سلول‌های بیگانه خوار (ماکروفاژها و هتروفیل‌ها) و جذب به نواحی آلوده، تاثیر قویتری بر روی عوامل بیماریزا دارد.

گونه هدف

طیور (گوشتی پولتهای جایگزین)

موارد مصرف

تیل مایکوزین جهت پیشگیری و درمان بیماریهای تنفسی در طیور شامل عفونتهای میکوپلاسمایی، CRD کمپلکس، وبای مرغان، عفونتهای ناشی از ارنیتوباکتریوم راینوتراکئال و بسیاری از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار و روش مصرف

طیور گوشتی: ۶۰ میلی لیتر از محلول کیمیا تیل مایکوزین ۲۵ در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی (معادل ۷۵ میلی گرم در ۱ لیتر) در هفته اول و ترجیحا در ۳ روز اول، سپس به مدت ۳-۱ روز ترجیحا ۲ روز پس از واکسیناسیون در هفته سوم و در پولتهای جایگزین، تجویز سوم به مدت ۲-۱ روز و ۴-۳ هفته پس از تجویز دوم می باشد.

توجه: مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و بهتر است با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

موارد منع مصرف :

تجویز تیل مایکوزین فسفات در طیور تخمگذار (در دوره تخمگذاری) که تخم آنها به مصرف انسان می رسد منع شده است.

تداخلات دارویی:

هیچگونه تداخل دارویی در رابطه با مصرف تیل مایکوزین گزارش نشده است.

زمان پرهیز از مصرف :

جوجه های گوشتی : ۱۲ روز قبل از ارسال به کشتارگاه.

موارد احتیاط:

پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طول مدت ۹۰ روز باید مصرف گردد.

محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا ۴ روز باید مصرف شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک ، (در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد) و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی

ظروف پلی اتیلنی ۶۰، ۲۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ میلی لیتری.



شرکت داروسازی کیمیافام ، فرمانیه ، ابتدای دیباجی شمالی ، پلاک ۶۲
تلفن : ۶۰ - ۲۲۸۲۴۶۵۷ فاکس : ۲۲۸۱۵۸۱۷
www.kimiafaam.com

