

ترکیب:

هر گرم پودر کیمیا سینوتریم 300 حاوی 250 میلی گرم سولفادiazین و 50 میلی گرم تری متوپریم می باشد.

مکانیسم اثر:

سولفادiazین از تبدیل اسید پارآمینو بنزوئیک به اسید دی هیدرو فولیک جلوگیری کرده و تری متوپریم از احیا اسید دی هیدروفولیک در روند ساخت اسیدهای نوکلئیک ممانعت به عمل می آورد. این دو ماده با اثر سینرژیک بر یکدیگر دارای خاصیت باکتریسیدی بوده و بر روی اغلب ارگانیزم های گرم منفی مانند گونه های اشرشیاکلی، هموفیلوس، پاستورلا، سالمونلا و باکتریهای گرم مثبت مانند استافیلوکوکها، استرپتوکوکها و نیز مایکوپلاسماها و پروتوزوآها موثر می باشند.

گونه هدف:

طیور (گوشتی، مادر)

موارد مصرف:

کیمیا سینوتریم 300 جهت پیشگیری، کنترل و درمان بسیاری از بیماریهای ناشی از عوامل باکتریایی حساس به سولفادiazین + تری متوپریم مانند CRD، کلی باسیلوز، کوریزای عفونی، پاستورلوز، پنومونیهای باکتریایی و سالمونلوز (اسهالهای عفونی) تجویز می گردد.

مقدار و روش مصرف:

1 کیلوگرم پودر کیمیا سینوتریم 300 در یک تن دان به مدت 6-5 روز توصیه می شود.

توجه: مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و بهتر است با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

موارد منع مصرف:

تجویز کیمیا سینوتریم 300 در طیور تخم گذاری که تخم آنها به مصرف انسان می رسد منع شده است.

تداخلات دارویی:

از تجویز همزمان کیمیا سینوتریم 300 با داروهای پلی پپتیدی، بتالاکتام ها و آمینوگلیکوزیدها خودداری گردد.

زمان پرهیز از مصرف:

مصرف دارو 5 روز قبل از کشتار طیور قطع گردد.

موارد احتیاط:

پس از باز شدن بسته بندی حداکثر ظرف مدت 30 روز مصرف گردد.

داروی آماده مصرف را حداکثر ظرف مدت 24 ساعت مصرف نمایید.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای کمتر از 25 درجه سانتیگراد، دور از رطوبت و نور نگهداری شود.

بسته بندی:

پاکتهای فویل آلومینیومی چندلایه 200، 500 و 1000 گرمی به صورت وکیوم



**SULFADIAZINE 25%+ TRIMETHOPRIM 5%
FEED PREMIX**

**سولفادiazین 25% + تری متوپریم 5%
پودر افزودنی به دان**

