

گروه دارویی : برونکودیلاتور و موکولیتیک

شکل دارویی : محلول خوراکی

ترکیب:

هر میلی لیتر محلول کیمیا هگزین حاوی 10/5 میلی گرم برم هگزین هیدروکلراید می باشد.

مکانیسم اثر:

برم هگزین یک ترکیب موکولیتیک است که با افزایش ترشح موکوس و رقیق کردن خلط و کمک به خروج آن از مجاری تنفسی و نیز با باز کردن برونشها و نای باعث سهولت تنفس و تسریع بهبودی بیماریهای تنفسی شده و نیز با افزایش نفوذپذیری غشاء سلولی باعث افزایش سطح ایمونوگلوبولینها در ترشحات برونشها می شود.

گونه هدف :

طیور (گوشتی، مادر، تخم گذار)

موارد مصرف:

- جهت کاهش دوره درمان و تسریع درمان بیماریهای تنفسی مانند CRD ، برونشیت عفونی، آنفلوانزا، نیوکاسل، کوریزای عفونی و ...
- سهولت در تنفس و اصلاح نقل و انتقال اکسیژن در ریهها
- افزایش اثر داروهای آنتی بیوتیک

مقدار و روش مصرف:

1 لیتر از محلول کیمیا هگزین در 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز متوالی.

موارد منع مصرف :

تجویز در طیور تخمگذاری که تخم آنها به مصرف انسان می رسد منع شده است.

تداخلات دارویی:

از تجویز همزمان با تتراسایکلینها خودداری گردد.

زمان پرهیز از مصرف:

مصرف دارو 48 ساعت قبل از کشتار طیور قطع گردد.

موارد احتیاط :

⚠ پس از باز شدن درب بطری، محصول در طول مدت 60 روز باید مصرف گردد.

⚠ محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا 24 ساعت مصرف شود.

شرایط نگهداری :

در جای خشک، در دمای کمتر از 25 ° C و دور از نور نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت گردد.

بسته بندی :

ظروف پلی اتیلنی یک لیتری و ظروف شیشه ای 200 میلی لیتری

