

ترکیب: هر لیتر محلول حاوی:

- عصاره منتول 100 گرم
- عصاره اکالیپتوس 220 گرم
- ویتامین E 10 گرم

مکانیسم اثر

منتول ترکیبی آلی است از گیاه نعناع و یا روغن آن که با تحریک انتهای اعصاب حسی مربوط به سرما باعث احساس خنکی و بی حسی شده و باعث تسهیل تنفس و نقل و انتقال اکسیژن در هنگام بروز بیماریهای تنفسی می شود.

اکالیپتوس موجود در منتوفورت باعث بر طرف شدن علائم احتقانی سیستم تنفسی شده و به رقیق شدن خلط و اتساع مجاری هوایی و آسان تر شدن تنفس در بیماران مبتلا به بیماری های تنفسی کمک می نماید. یکی از مواد موثره در اکالیپتوس سینول نام دارد که تنظیم آزادسازی مولکول های پیغام آور را بر عهده داشته و با کاهش واکنش های التهابی باعث جلوگیری از ترشح موکوس و خلط میشود.

ویتامین E در تنظیم اکسیداسیون سلولی و متابولیسم کربوهیدرات ها، کراتین عضلات و گلیکوژن نقش دارد. به عنوان آنتی اکسیدان از اکسیداسیون اسید های چرب غیر اشباع و ویتامین A جلوگیری می کند. همچنین باعث افزایش باروری و جوجه آوری در گله می گردد. **گونه حیوان هدف:** طیور (گوشتی، تخمگذار، مادر)

موارد مصرف

تقویت سیستم ایمنی بدن در هنگام بروز انواع استرس و بیماری ها
واکنش های ناشی از واکسیناسیون، برونشیت و نیوکاسل
عفونت های ناشی از برونشیت عفونی و آنفلونزا
موارد مشاهده عطسه در گله

گرمای خشک و شدید به ویژه هنگامی که غشای موکوسی مجاری تنفسی خشک شده و جوجه ها با مشکل تنفسی مواجه می شوند.
مواردی که آنتی بیوتیک ها موثر واقع نشوند و یا امکان مصرف دارو مقدور نباشد (مثلا نزدیک به زمان فرستادن طیور به کشتارگاه)

مقدار و روش مصرف

| زمان مصرف | مقدار مصرف برای 20000 قطعه | روش مصرف |
|---|---|----------------------------------|
| 2 بار در هفته | 100 تا 200 میلی لیتر در 1000 لیتر آب آشامیدنی | پیشگیری از عوارض تنفسی |
| 48 ساعت پس از واکسیناسیون به مدت 3 روز ، هر روز 2 مرتبه | 100 تا 200 میلی لیتر در 1000 لیتر آب آشامیدنی | پس از واکسیناسیون جهت کاهش عوارض |
| در روز 26-28 پرورش به مدت 3 روز، هر روز 2 مرتبه | 100 تا 200 میلی لیتر در 1000 لیتر آب آشامیدنی | هنگام بروز بیماریهای تنفسی |
| هفته ای 2 بار یا تکرار در صورت نیاز | 100 تا 200 میلی لیتر در 10 لیتر آب (به روش اسپری ریز) | پیشگیری از عوارض تنفسی |

تداخلات دارویی:

- از مصرف هم زمان منتوفورت با آنتی بیوتیک ها به خصوص خانواده کینولون ها پرهیز نمایید.
- از مصرف هم زمان منتوفورت با واکسن های نوع زنده خودداری نمایید(از 2 روز قبل تا 2 روز بعد از واکسیناسیون).

زمان پرهیز از مصرف: 2 روز قبل و بعد از واکسیناسیون

موارد احتیاط :

محلول آماده شده حداکثر تا 24 ساعت مصرف شود.
پس از باز شدن درب ظرف، محصول در طول مدت 60 روز مصرف گردد.
دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای 10-25 درجه و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:

ظروف پلی اتیلنی 200، 500 و 1000 میلی لیتری همراه با لیوان مدرج



