

TOLTRAZURIL 2.5%**تولترازوریل 2.5%****ORAL SOLUTION****محلول خوراکی****ترکیب:**

هر میلی لیتر از محلول خوراکی کیمیا تولتراکوکس حاوی 25 میلی گرم تولترازوریل می باشد.

مکانیسم اثر:

تولترازوریل در تقسیم هسته و فعالیت میتوکندری که مسئول متابولیسم تنفسی انگل است دخالت کرده و باعث کاهش آنزیمهای زنجیره تنفسی انگل می گردد و بر علیه طیف وسیعی از ایمریا های مولد کوکسیدیوز استفاده می شود.

گونه هدف: طیور (گوشتی و مرغ مادر گوشتی)، غاز و بوقلمون

موارد مصرف:

تولترازوریل یک آنتی کوکسیدبال وسیع الطیف است که برای درمان کوکسیدیوز بر علیه ایمریاهای مولد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی و مرغ مادر گوشتی مانند ایمریا آسروولینا، ایمریا برونٹی، ایمریا ماکسیما، ایمریا میتیس، ایمریا نکاتریکس و ایمریا تنلا و گونه های ایمریا آدنوتیدس، مله آگریمیتیس و مله آگریدیدس در بوقلمونها و بر علیه کوکسیدیای غاز، ایمریا آنسریس و ایمریا ترونکاتا مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار و روش مصرف:

7 میلی گرم تولترازوریل به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و یا 1 لیتر در 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 2 روز متوالی.

توجه: مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و بهتر است با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

موارد منع مصرف:

مصرف کیمیا تولتراکوکس در طیور تخم گذاری که تخم مرغ آنها به مصرف انسان می رسد منع شده است.

تداخلات دارویی: ندارد**زمان پرهیز از مصرف:**

مصرف دارو باید 8 روز قبل از کشتار قطع گردد.

شرایط نگهداری:

در ظروف در بسته، در جای خشک، در دمای کمتر از 25 درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت گردد.

بسته بندی

ظروف پلی اتیلنی 200، 300، 500 و 1000 میلی لیتری به همراه لیوان مدرج



TOLTRAZURIL 2.5%

تولترازوریل 2.5%

ORAL SOLUTION

محلول خوراکی

