

AMPROLIUM 25 % + ETHOPABATE 1.6 %

آمپرولیوم 25٪ + اتوپابات 1/6٪

FEED PREMIX

پریمیکس مخلوط در دان

ترکیب:

هر گرم پودر حاوی 250 میلی گرم آمپرولیوم هیدروکلراید و 16 میلی گرم اتوپابات می باشد.

مکانیسم اثر:

آمپرولیوم ترکیبی مشابه تیامین بوده که مورد نیاز ایمریا می باشد که بدینوسیله در متابولیسم انگل اختلال ایجاد می کند. آمپرولیوم بیشترین اثر را در سه روز اول چرخه زندگی ایمریا دارد. آمپرولیوم بر مروزوایتها و مراحل گامتوگونی و شیزوگونی نیز اثر دارد. اتوپابات جانشین شونده PABA بوده و با ممانعت از ساخته شدن THFA اثر ضدکوکسیدیایی خود را اعمال می کند

موارد مصرف:

کیمیا آمپرولیوم اتوپابات جهت پیشگیری و درمان کوکسیدیوز ناشی از ایمریاهای مختلف شامل ایمریا نکاتریکس، ماکسیما، آسروولینا، ایمیتیس، تنلا، برونٹی در طیور گوشتی، پولتهای تخمگذار و مادر و ایمریا آدنوئیدس و مله آگریدیس در بوقلمون تجویز می گردد.

مقدار و روش مصرف:

طیور گوشتی: 500 گرم کیمیا آمپرولیوم اتوپابات در هر تن دان تا 3 روز قبل از کشتار

پولتهای تخمگذار و مادر:

- تا 6 هفتگی 400 گرم در هر تن دان

- از 6 تا 12 هفتگی: 325 گرم در هر تن دان

- و از 12 تا 18 هفتگی: 250 گرم در هر تن دان

بوقلمونها: 500 گرم در هر تن دان تا سن 10-8 هفتگی

موارد منع مصرف:

تجویز کیمیا آمپرولیوم اتوپابات در طیور تخمگذاری که تخم آنها به مصرف انسان می رسد منع شده است.

تداخلات دارویی:

همراه با سایر داروهای ضد کوکسیدیوز مصرف نگردد و در جیره های حاوی کولین و بنتونیت نباید مصرف گردد.

زمان پرهیز از مصرف:

طیور گوشتی : 3 روز قبل از کشتار

موارد احتیاط:

با توجه به تشخیص کلینیسین معمولاً به جیره مقدار کمی ویتامین B₁ اضافه می گردد.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، خنک(در دمای کمتر از 25 درجه) و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:

پاکت های فویل آلومینیومی چند لایه 5 و 1 کیلو گرمی به صورت وکیوم



AMPROLIUM 25 % + ETHOPABATE 1.6 %

آمپرولیوم 25٪ + اتوپابات 1/6٪

FEED PREMIX

پریمیکس مخلوط در دان

