

SALINOMYCIN 12 %**FEED ADDITIVE PREMIX****سالینومایسین 12%****پودر افزودنی به دان****ترکیب**

هر کیلوگرم کیمیا سالیانو 12 حاوی 120 گرم سالینومایسین سدیم می باشد.

مکانیسم اثر

کیمیا سالیانو 12 یک کوکسیدیواستات یونوفوره است که نفوذپذیری غشاء سلول تک یاخته را نسبت به کاتیونهایی مانند یون سدیم تغییر داده و باعث افزایش فشار اسمزی داخل سلول می گردد و در نتیجه تعادل یونی در دو سوی غشاء بهم خورده و باعث اختلال در متابولیسم انگل می شود. سالینومایسین بر روی مراحل اسپوروزوئیت، مروزوئیت و شیزونت های بالغ کوکسیدیا اثر گذاشته و بدینوسیله چرخه زندگی گونه های مختلف آیمیریا در طیور را مختل می کند و از تکامل و بلوغ شیزونت ها قبل از اینکه بتوانند به روده های طیور آسیب شدیدی برسانند جلوگیری می نماید.

توجه: مصرف سالینومایسین هیچ اثر نامطلوبی بر روی اشتها، تغذیه و کیفیت لاشه طیور نداشته و مصرف آب را افزایش نمی دهد و در نتیجه باعث افزایش رطوبت بستر نیز نمی گردد. سالینومایسین در مقابل حرارت پلتایزر مقاوم بوده و با دان بطور یکنواخت مخلوط می گردد.

گونه هدف: طیور (جوجه های گوشتی، پولتهای تخمگذار)

موارد مصرف

سالینومایسین با اثر بر روی مراحل مختلف رشد تک یاخته کوکسیدیا (اسپوروزوئیت ها، مروزوئیت ها و شیزونت های بالغ) برای پیشگیری از کوکسیدیوز ناشی از گونه های مختلف آیمیریا در طیور مانند آسروولینا، ماکزیم، نکاتریکس، میواتی، برونیتی و تنلا استفاده می شود.

مقدار و روش مصرف

طیور گوشتی: 500 گرم سالینومایسین 12% در هر تن دان از یک روزگی تا 5 روز قبل از کشتار.
پولتهای تخمگذار: 350-500 گرم سالینومایسین 12% در هر تن دان از یک روزگی تا 7 روز قبل از شروع تخمگذاری.
توجه: برای بدست آوردن مخلوط یکنواخت از دارو در دان ابتدا میزان مورد نیاز را با مقدار 50-20 کیلو گرم دان مخلوط کرده و سپس مخلوط حاصل را به مقدار دان نهایی اضافه نموده ، مجدداً مخلوط نمایید.

موارد منع مصرف

مصرف سالینومایسین در بوقلمونها، تک سمی ها و نیز پولتهای تخم گذار تا 7 روز قبل از شروع تخمگذاری منع شده است.

تداخلات دارویی

تجویز همزمان سالینومایسین با تیامولین موجب کاهش شدید رشد می گردد، لذا از مصرف آن حداقل 7 روز قبل و بعد از مصرف تیامولین پرهیز شود. همچنین از مصرف سالینومایسین با سایر داروهای ضدکوکسیدیوز باید خودداری گردد.

زمان پرهیز از مصرف

مصرف دارو 5 روز قبل از کشتار طیور قطع شود.

موارد احتیاط:

پس از باز شدن بسته بندی حداکثر ظرف مدت 2 ماه مصرف گردد.
داروی آماده مصرف را حداکثر ظرف مدت 24 ساعت مصرف نمائید.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای کمتر از 25 درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود.
بسته بندی: پاکتهای فویل آلومینیومی چند لایه 100، 200، 500، 1000 و 5000 گرمی به صورت وکیوم



SALINOMYCIN 12 %
FEED ADDITIVE PREMIX

سالینومایسین 12%
پودر افزودنی به دان

