

گروه دارویی: ضدانگل داخلی

نام ژنریک: لوامیزول + تریکلابندازول 8/75%

شکل دارویی: سوسپانسیون خوراکی

ترکیب:

هر لیتر از کیمیا تریکللامیزول® حاوی 50 گرم تریکلابندازول و 37/5 گرم لوامیزول هیدروکلراید می باشد.

مکانیسم اثر:

لوامیزول از خانواده ایمیدازوتیازول ها و ایزومر چپ گرد تترامیزول می باشد که با تاثیر بر روی سیستم عصبی انگل باعث فلج شدن سریع و در نتیجه تسهیل جدا شدن آنها از غشاهای مخاطی دستگاه گوارش و تنفس دام ها و تسریع خروج انگل از بدن حیوان می گردد. تریکلابندازول از گروه بنزایمیدازولها می باشد ولی مکانیسم اثر آن تا حدودی با سایر داروهای این گروه متفاوت است. این دارو از طریق مهار آنزیم فومارات رودوکتاز، اعمال متابولیسمی و تولید انرژی بدن انگل را مختل نموده و باعث نابودی آن می شود. این دارو بر چرخه زندگی انگل از مرحله نابالغ تاثیر کامل دارد.

گونه هدف: گوسفند و بز

موارد مصرف:

داروی ضد انگل وسیع الطیف برای کنترل و درمان آلودگی های انگلی در گوسفند و بز مانند:

مراحل بالغ و نابالغ نماتود های گوارشی (همونکوس، کوپریا، نماتودیروس و سایر نماتود ها)

مراحل بالغ و نیمه بالغ نماتود های ریوی (گونه های مختلف دیکتیوکولوس)

مراحل بالغ، نیمه بالغ و نابالغ ترماتود های گوارشی (گونه های مختلف فاسیولا)

مقدار و روش مصرف:

به میزان 1 میلی لیتر از سوسپانسیون خوراکی به ازای 5 کیلوگرم وزن زنده دام

توجه:

درمان باید همزمان با ظهور آلودگی در گله، صورت گیرد.

مدت و مقدار مصرف بهتر است با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

موارد منع مصرف:

ندارد.

تداخلات دارویی:

ندارد.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: 28

شیر: 7 روز

احتیاط:

پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طول مدت 60 روز باید مصرف گردد.

محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا 24 ساعت باید مصرف شود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

شرایط نگهداری:

در ظروف کاملاً دربسته، در جای خشک و در دمای کمتر از 25 °C و دور از نور نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت گردد.

بسته بندی:

ظروف پلی اتیلنی 200، 500 و 1000 میلی لیتری

