

**Calcium Carbasalate + Vitamin C  
WATER SOLUBLE POWDER****کرباسالات کلسیم + ویتامین C  
پودر محلول در آب****ترکیب**

هر گرم پودر کیمیا سالات - ث حاوی:

کرباسالات کلسیم: 770 میلی گرم معادل 600 میلی گرم استیل سالیسیلیک اسید  
آسکوربات سدیم: 75/2 میلی گرم معادل 66/5 میلی گرم ویتامین C (آسکوربیک اسید)

**مکانیسم اثر**

استیل سالیسیلیک اسید با مهار سنتز پروستاگلاندین ها و آزاد کردن برادی کینین باعث تخفیف درد شده، با انبساط عروق و افزایش تعریق باعث کاهش تب و با تثبیت غشاء لیزوزیمها مانع فعال شدن پیامهای شیمیایی ایجاد التهاب می شود. همچنین به عنوان یک عامل ضد انعقاد جهت رقیق سازی و تسریع جریان خون عمل می کند.

ویتامین C نیز با تقویت واکنشهای اکسیداسیون و احیا سلولی باعث افزایش مقاومت بدن در برابر عوامل عفونی ( ویروسها و باکتریها و...) و عوامل استرس زا ( گرما، حمل و نقل، واکسیناسیون و...) می گردد.

**گونه هدف:** طیور (گوشتی، تخمگذار و مادر)

**موارد مصرف**

- افزایش مقاومت در مقابل بیماریهای عفونی ( آنفلوآنزا، CRD، کلی باسیلوز و... )
- افزایش مقاومت در مقابل استرس های محیطی مانند گرما، سرما و سایر استرس ها
- کاهش عوارض بیماریها (تب، درد، التهاب و ... )
- افزایش پاسخ ایمنی در زمان واکسیناسیون
- افزایش قدرت باروری و قابلیت جوجه در آوری در طیور مادر
- بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ
- کاهش عوارض ناشی از اختلالات متابولیکی در نژادهای گوشتی مثل دیسکندروپلازی درشت نی و دژنراسیون ران

**مقدار و روش مصرف**

200 گرم از پودر کیمیا سالات - ث در 500 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5 روز.

توجه: بهتر است مدت و مقدار مصرف با توجه به شدت و نوع بیماری با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

**موارد منع مصرف**

در مرغان تخمگذار در طول مدت درمان، مصرف تخم مرغ منع شده است.

**تداخلات دارویی:** ندارد.

**زمان پرهیز از مصرف**

مصرف دارو 7 روز قبل از کشتار طیور قطع گردد.

**احتیاط**

محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر طی 12 ساعت مصرف شود.

**شرایط نگهداری**

در جای خشک، خنک و دور از نور نگهداری شود.

**بسته بندی**

ساشه های فویل آلومینیومی چند لایه 200 گرمی به صورت وکیوم



Calcium Carbasalate + Vitamin C  
WATER SOLUBLE POWDER

کرباسالات کلسیم + ویتامین C  
پودر محلول در آب

