

ترکیب

هر لیتر محلول حاوی:

25000	میلی گرم	ال-کارنیتین
66000	میلی گرم	بتائین هیدروکلراید
100000	میلی گرم	سوربیتول
210000	میلی گرم	منیزیم کلراید 6 آبه

گونه هدف

طیور (گوشتی ، تخمگذار، مادر)

موارد مصرف

- تقویت متابولیسم چربیها جهت افزایش رشد و تولید و جلوگیری از چرب شدن لاشه
- بهبود رشد در نژادهای گوشتی و تولید در مرغان تخمگذار
- افزایش ترشح صفرا، ملین و مدر

مقدار و روش مصرف

1-2 لیتر از محلول کیمیا ال سی ویت در 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 10-3 روز متوالی و تکرار در صورت نیاز.
توجه: بهتر است مدت و مقدار مصرف با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

موارد احتیاط :

پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طی مدت 60 روز باید مصرف گردد .
محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا 24 ساعت باید مصرف شود .

شرایط نگهداری

در جای خشک، دردمای کمتر از 25 درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت گردد.

بسته بندی

ظروف پلی اتیلنی 200، 500 و 1000 میلی لیتری به همراه لیوان مدرج



L – CARNITINE + BETAINE +SORBITOL +Mg

ال-کارنیتین + بتائین + سوربیتول + منیزیم

ORAL SOLUTION

محلول خوراکی



شرکت داروسازی کیمیافام، فرمانیه، ابتدای دیباجی شمالی، پلاک 62
تلفن: 60 - 22824657 فاکس: 22815817

www.kimiafaam.com

