

MULTIVITAMIN + AMINO ACID
WATER SOLUBLE POWDER

مولتی ویتامین + اسید آمینه
پودر محلول در آب

گروه دارویی: ویتامین + اسید آمینه
ترکیب:
هر گرم پودر حاوی:

ویتامین A	10000	واحد بین المللی
ویتامین D ₃	2000	واحد بین المللی
ویتامین E	2	میلی گرم
ویتامین K ₃	0/4	میلی گرم
ویتامین B ₁	4	میلی گرم
ویتامین B ₂	0/6	میلی گرم
کلسیم دپنتوتنات	2	میلی گرم
نیکوتین آمید	6	میلی گرم
ویتامین B ₆	0/6	میلی گرم
ویتامین C	20	میلی گرم
سیستئین	6	میلی گرم
متیونین	12	میلی گرم

مکانیسم اثر

ویتامین A: با محافظت از بافتهای اپیتلیالی از نفوذ عوامل بیماری زا جلوگیری می کند و در رشد استخوانها و بهبود بینایی و باروری نقش اساسی دارد.

ویتامین D₃: در تنظیم متابولیسم کلسیم و فسفر نقش داشته و باعث افزایش جذب کلسیم و فسفر از روده می گردد. این ویتامین در شکل گیری استخوانها نقش اساسی دارد.

ویتامین E: در تنظیم اکسیداسیون سلولی و متابولیسم کربوهیدراتها، کراتین عضلات و گلیکوژن نقش دارد. به عنوان آنتی اکسیدان از اکسیداسیون اسیدهای چرب غیر اشباع و ویتامین A جلوگیری می کند. همچنین باعث افزایش باروری و جوجه درآوری در گله می گردد.

ویتامین K₃: ویتامین K₃ در مکانیسم انعقاد خون در بدن نقش مهمی را ایفا می کند و در سنتز کبیدی فاکتورهای انعقادی لازم و ضروری است.

ویتامینهای گروه B: در چرخه های متابولیسم سلولی، متابولیسم پروتئین ها، چربی ها و کربوهیدراتها و نیز واکنشهای حیاتی و افزایش مقاومت بدن نقش اساسی دارند.

ویتامین C: با تقویت واکنشهای اکسیداسیون و احیا سلولی باعث افزایش مقاومت بدن در برابر عوامل عفونی (ویروسها و باکتریها و...) و عوامل استرس زا (گرما، حمل و نقل، واکسیناسیون و...) می گردد.

اسیدهای آمینه: واحد ساختمانی پروتئینها بوده و در رشد اسکلت و عضلات بدن دخالت دارند. همچنین در فعالیتهای متابولیک، هورمونی و ایمنی بدن دخالت می کنند. در تنظیم فشار اسمزی و تبادلات سلولی نیز نقش دارند.

گونه هدف: طیور (مادر گوشتی تخمگذار)

موارد مصرف

جهت افزایش مقاومت بدن طیور، بهبود ضریب تبدیل غذایی، افزایش سرعت رشد و بهبود کیفیت گوشت و تخم مرغ و همچنین



در موارد استرس های ناشی از گرما و سرما، واکسیناسیون، حمل و نقل و بیماری های عفونی مصرف این محصول توصیه می شود.

مقدار و روش مصرف

پیشگیری: 1-2 گرم از محصول در 1 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 روز.

درمان: 2-5 گرم از محصول در 1 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5 روز.

توجه: بهتر است مدت و مقدار مصرف با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

موارد احتیاط:

پس از باز شدن بسته بندی حداکثر ظرف مدت 1 ماه مصرف گردد.

داروی آماده مصرف را حداکثر ظرف مدت 12 ساعت مصرف نمائید.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای کمتر از 25 درجه، دور از رطوبت و نور نگهداری شود.

بسته بندی:

پاکتهای فویل آلومینیومی چند لایه 100، 200، 500، 1000 و 5000 گرمی به صورت وکیوم



MULTIVITAMIN + AMINO ACID
WATER SOLUBLE POWDER

مولتی ویتامین + اسید آمینه
پودر محلول در آب

