

**ترکیب**

هر لیتر محلول حاوی:

ویتامین E 100000 میلی گرم

سلنیت سدیم 500 میلی گرم

**گونه هدف**

طیور (مادر گوشتی تخمگذار)

**موارد مصرف**

- عوارض ناشی از کمبود ویتامین E و سلنیوم
- تقویت سیستم ایمنی با تحریک فرآیندهای ایمونولوژیک
- نرمی غیر طبیعی مغز (انسفالومالاسی)
- دیستروفی عضلانی
- در هنگام کاهش جوجه درآوری و مشکلات باروری
- در مواقع کاهش رشد و جهت بهبود کیفیت گوشت سینه
- در مواقع استرس گرمایی و سایر استرس ها
- کاهش موارد ابتلا به آسیت

**مقدار و روش مصرف**

طیور: 1 لیتر در 1000 تا 2000 لیتر آب آشامیدنی

توجه: بهتر است مدت و مقدار مصرف با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

**موارد احتیاط:**

پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طی مدت 60 روز باید مصرف گردد.  
محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا 24 ساعت باید مصرف شود.

**شرایط نگهداری**

در جای خشک، خنک (در دمای کمتر از 25 درجه) و دور از نور نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت گردد.

**بسته بندی**

ظروف پلی اتیلنی نیم و یک لیتری به همراه لیوان مدرج



**SODIUM SELENITE+ VITAMIN E**

**سلنیت سدیم + ویتامین E**

**ORAL SOLUTION**

**محلول خوراکی**

