

ترکیب

هر لیتر محلول حاوی :

کلسیم	406000	میلی گرم
منیزیم	16000	میلی گرم
ویتامین D ₃	200000	واحد بین المللی

گونه هدف

طیور (مادر گوشتی تخمگذار) - دام

موارد مصرف**طیور:**

- کلیه عوارض ناشی از کمبود کلسیم و منیزیم
- استحکام پوسته تخم مرغ
- افزایش رشد و تولید

دام:

- قبل از زایمان جهت کنترل کلسیم و منیزیم خون برای جلوگیری از بروز تب شیر
- تامین کلسیم جهت آمادگی برای دوره شیرواری دام
- همزمان با تزریق کلسیم جهت درمان حمایتی کمبود کلسیم (هیپوکلسمی)

مقدار و روش مصرف:**طیور:**

1 لیتر از محلول کیمیا الکترولیت - D در 1000 تا 2000 لیتر آب آشامیدنی

دام:

- الف) جهت پیشگیری از تب شیر: 1 تا 2 لیتر از محلول قبل از زایمان به هر گاو خورنده شود و به فاصله هر 12 ساعت تکرار گردد.
 - ب) جهت درمان حمایتی هیپوکلسمی: 1 لیتر از محلول به هر گاو خورنده شود و به فاصله هر 12 تا 24 ساعت تکرار گردد.
 - ج) سایر موارد: 1 تا 2 لیتر از محلول و تکرار هر 24 ساعت
- توجه:** مدت و مقدار مصرف بهتر است با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

عوارض جانبی :

مصرف چندین برابر مقادیر توصیه شده موجب بروز عوارضی مانند آریتمی قلبی، بی اشتها و ضعف عضلانی می گردد.

موارد احتیاط :

- پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طی مدت 60 روز باید مصرف گردد .
- محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا 24 ساعت باید مصرف شود .

شرایط نگهداری

در جای خشک، در دمای کمتر از 25 درجه و دور از نور نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت گردد.

بسته بندی

ظروف پلی اتیلنی 200، 500 و 1000 میلی لیتری به همراه لیوان مدرج



Ca + Mg + D3

(کلسیم + منیزیم + ویتامین D₃)

ORAL SOLUTION

محلول خوراکی

