

ترکیب

میزان ماده موثره در هر گرم پودر:		
ویتامین A	15000	واحد بین المللی
ویتامین D ₃	3000	واحد بین المللی
ویتامین E	15	میلی گرم
ویتامین K ₃	2	میلی گرم
ویتامین B ₁	3	میلی گرم
ویتامین B ₂	5/5	میلی گرم
کلسیم دپنتوتنات	15	میلی گرم
نیکوتین آمید	30	میلی گرم
ویتامین B ₆	1/02	میلی گرم
ویتامین B ₉	0/6	میلی گرم
ویتامین B ₁₂	0/03	میلی گرم
بیوتین	0/2	میلی گرم
کولین کلراید	12/7	میلی گرم
سدیم کلراید	111	میلی گرم
پتاسیم کلراید	11	میلی گرم
کلسیم کلراید	87	میلی گرم
منیزیم سولفات	11	میلی گرم

مکانیسم اثر

ویتامینهای A، D₃، E و K₃ حفظ بافتهای پوششی، افزایش مقاومت بدن، شکل گیری استخوانها، تنظیم متابولیسم کلسیم و فسفر، اکسیداسیون سلولی و افزایش باروری گله و کمک به انعقاد خون و مهار خونریزی نقش اساسی دارند.

ویتامینهای گروه B: عمدتاً در چرخه های متابولیسم سلولی، متابولیسم پروتئین ها، چربی ها و کربوهیدراتها نقش بسزایی دارند.

الکترولیتهای بکار رفته در این فرمول به منظور تنظیم تبادلات یونی و حفظ حجم کلی مایعات بدن و جلوگیری از تغییرات شدید فشار اسمزی در مایعات داخل و خارج سلولی استفاده می شوند.

گونه هدف

طیور (گوشتی مادر تخمگذار)

موارد مصرف

در زمان بروز اختلالات و عوارض ناشی از کمبود الکترولیت ها و ویتامین ها مانند:

- بی اشتهاپی و ضعف
- کاهش مقاومت عمومی بدن در برابر بیماریهای عفونی
- کاهش کمبود الکترولیت متعاقب بروز اسهال



- جلوگیری از استرس حمل و نقل و واکسیناسیون
- کاهش تولید و رشد
- افت کیفیت پوسته تخم مرغ و پروزیس

مقدار و روش مصرف

پیشگیری: 100 گرم از محصول در 200 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3-5 روز.
درمان: 100 گرم از محصول در 100 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-7 روز.
توجه: بهتر است مدت و مقدار مصرف با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

موارد احتیاط:

پس از باز شدن بسته بندی حداکثر ظرف مدت 1 ماه مصرف گردد.
داروی آماده مصرف را حداکثر ظرف مدت 24 ساعت مصرف نمایید.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای کمتر از 25 درجه و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی

پاکتهای فویل آلومینیومی چند لایه 100، 200، 500، 1000 و 5000 گرمی به صورت وکیوم



