

LYSINE+ METHIONINE + CHOLINE + Mg + SORBITOL
ORAL SOLUTION

لیزین + متیونین + کولین + منیزیم + سوربیتول
محلول خوراکی

ترکیب

هر لیتر محلول حاوی:

سوربیتول	450000	میلی گرم
لیزین	15000	میلی گرم
متیونین	10000	میلی گرم
منیزیم	5000	میلی گرم
کولین	50000	میلی گرم

گونه هدف: طیور (مادر گوشتی تخمگذار)

موارد مصرف

- تنظیم عملکرد کبد (گوارشی، دیورتیک، تامین انرژی، سم زدایی)
- کنترل و پیشگیری از سندرم کبد چرب و مشکلات کلیوی
- افزایش متابولیسم چربی در هنگام استفاده از رژیمهای غذایی با چربی و ازت بالا
- جهت تحریک اشتها

مقدار و روش مصرف

1 لیتر از محلول کیمیا مریل در 1000 تا 2000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3-5 روز

توجه: بهتر است مدت و مقدار مصرف با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

موارد احتیاط:

پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طی مدت 60 روز باید مصرف گردد.

محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا 24 ساعت باید مصرف شود.

شرایط نگهداری

در جای خشک، خنک (در دمای کمتر از 25 درجه) و دور از نور نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت گردد.


بسته بندی

ظروف پلی اتیلنی یک لیتری به همراه لیوان مدرج



LYSINE+ METHIONINE + CHOLINE + Mg + SORBITOL
ORAL SOLUTION

لیزین + متیونین + کولین + منیزیم + سوربیتول
محلول خوراکی



شرکت داروسازی کیمیفام، فرمانیه، ابتدای دیباجی شمالی، پلاک 62
تلفن: 60 - 22824657 فاکس: 22815817

www.kimiafaam.com

