

**ترکیب:**

هر گرم پودر کیمیا اریترو 20 حاوی 200 میلی گرم اریترومایسین به فرم تیوسیانات میباشد

**مکانیسم اثر:**

اریترومایسین از آنتی بیوتیک های ماکرولیدی است که با اتصال به تحت واحد S 50 ریبوزومی از سنتز پروتئین های باکتری جلوگیری می کند. این دارو در دوزهای پایین اثر باکتریواستاتیک و در دوزهای بالا اثر باکتریسید دارد. اریترومایسین با مکانیسم فوق بر روی باکتریهای گرم مثبت مانند استافیلوکوکوس ها و استرپتوکوکوس ها، کورینه باکتریوم، لیستریا، باسیلوس آنتراسیس، کلسترییدیوم و باکتری های گرم منفی مانند هموفیلوس، پاستورلا، بروسلا و همچنین کلامیدیا، میکوپلاسما و ریکتزیا موثر می باشد.

**گونه هدف:**

طیور (گوشتی، تخمگذار، مادر)

**موارد مصرف:**

کیمیااریترو 20 برای درمان بیماریهای ناشی از عوامل باکتریایی حساس به اریترومایسین مانند CRD کمپلکس، کریزای عفونی، عفونتهای میکوپلاسمایی، آنتریت و عفونتهای دستگاه ادراری- تناسلی مقاوم به پنی سیلین در طیور تجویز میگردد.

**مقدار و روش مصرف:**

1000-500 گرم کیمیا اریترو 20 در 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز بر اساس سن و وزن می باشد.

**توجه:** مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و باید با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

**موارد منع مصرف:**

با توجه به دوز توصیه شده هیچگونه منع مصرفی ندارد.

**تداخلات دارویی:**

تجویز همزمان این دارو با آمینوگلیکوزیدها، تتراسایکلین ها، لینکوزامیدها و بتالاکتام ها ممکن است موجب ایجاد تداخل دارویی گردد.

**زمان پرهیز از مصرف:**

مصرف دارو 3 روز قبل از کشتار طیور قطع گردد.

مصرف دارو در طیور تخمگذار، 6 روز قبل از مصرف تخم مرغ باید قطع گردد.

**شرایط نگهداری:**

در جای خشک، در دمای کمتر از 25 درجه و دور از نور نگهداری شود.

**بسته بندی:**

پاکتهای فویل آلومینیومی چند لایه 500 گرمی به صورت وکیوم



ERYTHROMYCIN 20 %

اریترومایسین 20 %

WATER SOLUBLE POWDER

پودر محلول در آب



شرکت داروسازی کیمیا فام، فرمانیه، ابتدای دیباجی شمالی، پلاک 62

تلفن : 60 - 22824657 فاکس : 22815817

[www.kimiafaam.com](http://www.kimiafaam.com)

