

ترکیب:

هر گرم از پرمیکس کیمیا لوزین فسفات حاوی 250 میلی گرم تایلوزین فسفات می باشد.

مکانیسم اثر:

تایلوزین یک آنتی بیوتیک ماکرولیدی و باکتریواستاتیک بوده که با اتصال به تحت واحد S 50 ریبوزوم باکتری از سنتز پروتئین آن جلوگیری می کند و با این مکانیسم بر روی میکروارگانیزمهایی مانند مایکوپلاسما و کلامیدیا و همچنین باکتریهای هوازی و بی هوازی گرم مثبت نظیر استافیلوکوکها ، استرپتوکوکها و کورینه باکتریومها و نیز بعضی از باکتریهای گرم منفی مانند پاستورلا ، هموفیلوس و سویه های نیسریا اثر می گذارد.

گونه هدف: طیور (جوجه های گوشتی و پولتها)

موارد مصرف:

جوجه های گوشتی و پولت های جایگزین تخمگذار:

- پیشگیری و درمان بیماریهای تنفسی ناشی از مایکوپلاسماها (CRD)

- پیشگیری و درمان آنتریت نکروتیک ناشی از کلستریدیوم پرفرینجنس

مقدار و روش مصرف:

* 127 میلی گرم تایلوزین برای هر کیلوگرم وزن بدن در روز جهت پیشگیری و درمان بیماری های تنفسی (معادل 508 میلی گرم کیمیا لوزین فسفات) و یا 4/4 کیلوگرم کیمیا لوزین فسفات در هر تن دان در 5 روز اول زندگی و سپس تکرار درمان در هفته 4- 3 .

* 20- 10 میلی گرم تایلوزین برای هر کیلوگرم وزن بدن در روز جهت پیشگیری و درمان آنتریت نکروتیک (معادل 80- 40 میلی گرم کیمیا لوزین فسفات) و یا 700- 350 گرم کیمیا لوزین فسفات در هر تن دان به مدت 7 روز.

توجه: مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و باید با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

موارد منع مصرف:

از مصرف تایلوزین فسفات در طیور تخمگذار (در دوره تخمگذاری) که تخم آنها به مصرف انسان می رسد خودداری گردد.

تداخلات دارویی:

از تجویز همزمان تایلوزین فسفات با لینکوزامیدها و آمینوگلیکوزیدها خودداری گردد.

زمان پرهیز از مصرف:

مصرف دارو 1 روز قبل از کشتار طیور قطع گردد.

احتیاط:

جهت توزیع یکنواخت تایلوزین فسفات 25% در دان، ابتدا مقدار مورد نیاز را با 50 کیلوگرم ماده اولیه، مکمل و یا دان به خوبی مخلوط کرده و سپس مخلوط حاصل را در حجم دان نهایی اضافه نموده و مجدداً مخلوط نمایید.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای کمتر از 25 درجه و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:

پاکتهای فویل آلومینیومی چند لایه 1000 گرمی به صورت کیوم



TYLOSIN PHOSPHATE 25 %

تایلوزین فسفات 25 %

FEED PREMIX

پریمیکس مخلوط در دان

