

TIAMULIN 45 %
WATER SOLUBLE POWDER

تیامولین 45 %
پودر محلول در آب

ترکیب:

هر گرم پودر کیمیامولین 45 حاوی 450 میلی گرم تیامولین هیدروژن فومارات می باشد.

مکانیسم اثر:

تیامولین آنتی بیوتیکی از مشتقات پلوروموتیلین است که با اتصال به تحت واحد S 50 ریبوزوم و مهار سنتز پروتئین میکروارگانیسم ها موجب توقف فعالیتهای حیاتی آنها می گردد. کیمیامولین 45 علیه باکتریهای گرم مثبت مانند گونه های مختلف استافیلوکوک، استرپتوکوک، کلستریدیوم و باکتریهای گرم منفی مانند گونه های مختلف هموفیلوس، پاستورلا، کمپیلوباکتر، اکتینوباسیلوس و بطور اختصاصی بر گونه های مختلف اسپیروکت و مایکوپلاسما موثر می باشد

گونه هدف:

طیور (گوشتی، تخمگذار، مادر و بوقلمون)

موارد مصرف:

کیمیامولین 45 جهت پیشگیری، کنترل و درمان بیماریهای عفونی مانند : CRD، CRD-Coli، سینوویت عفونی، سینوزیت، اسهال خونی اسپیروکتی و کوریزای عفونی مصرف می گردد.

مقدار و روش مصرف:

پیشگیری: 100 گرم در 400-360 لیتر آب به مدت 3-1 روز (این دوز هر 6-3 هفته بسته به شدت درگیری و استرس تکرار شود).
درمان: 100 گرم در 200-180 لیتر آب به مدت 5-3 روز.

توجه: مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و باید با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

موارد منع مصرف: ندارد

تداخلات دارویی:

از مصرف همزمان با ناراسین، موننسن و سالینومایسین خودداری گردد.

زمان پرهیز از مصرف:

مصرف دارو 2 روز قبل از کشتار طیور گوشتی و 5 روز قبل از کشتار بوقلمون قطع گردد.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، خنک (در دمای 25 درجه) و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:

پاکت های فویل آلومینیومی چند لایه 100 گرمی به صورت وکیوم



TIAMULIN 45 %
WATER SOLUBLE POWDER

تیامولین 45 %
پودر محلول در آب

