

ترکیب:

هر میلی لیتر کیمیاپریم ۴۸ حاوی ۴۰۰ میلی گرم سولفادiazین سدیم و ۸۰ میلی گرم تری متوپریم است.

مکانیسم اثر:

سولفادiazین از تبدیل اسید پارآمینو بنزوئیک به اسید دی هیدرو فولیک جلوگیری کرده و تری متوپریم از احیا اسید دی هیدروفولیک در روند ساخت اسیدهای نوکلئیک ممانعت به عمل می آورد. این دو ماده با اثر سینرژیک بر یکدیگر دارای خاصیت باکتریسیدی بوده و بر روی اغلب ارگانیزم های گرم منفی مانند گونه های اشرشیاکلی، هموفیلوس، پاستورلا، سالمونلا و باکتریهای گرم مثبت مانند استافیلوکوکها، استرپتوکوکها و نیز مایکوپلاسماها و پروتوزوآها موثر می باشند.

گونه هدف:

طیور (گوشتی، مادر)

موارد مصرف:

کیمیاپریم ۴۸ جهت پیشگیری، کنترل و درمان بسیاری از بیماریهای ناشی از عوامل باکتریایی حساس به سولفادiazین + تری متوپریم مانند CRD، کلی باسیلوز، کوریزای عفونی، پاستورلوز، پنومونیهای باکتریایی و سالمونلوز (اسهالهای عفونی) تجویز می گردد.

مقدار و روش مصرف:

۲۵۰ میلی لیتر از کیمیا پریم ۴۸ در ۱۰۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۵-۳ روز بر اساس سن و وزن می باشد.

توجه: مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و بهتر است با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

موارد منع مصرف:

تجویز کیمیاپریم ۴۸ در طیور تخم گذاری که تخم آنها به مصرف انسان می رسد منع شده است.

تداخلات دارویی:

از تجویز همزمان کیمیا پریم ۴۸ با داروهای پلی پپتیدی، بتالاکتام ها و آمینوگلیکوزیدها خودداری گردد.

زمان پرهیز از مصرف:

مصرف دارو ۵ روز قبل از کشتار طیور قطع گردد.

موارد احتیاط:

پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طول مدت ۶۰ روز باید مصرف گردد.

محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا ۲۴ ساعت باید مصرف شود.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، خنک (در دمای کمتر از ۲۵ درجه) و دور از نور نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت گردد.

بسته بندی:

ظروف شیشه ای قهوه ای ۲۵۰ میلی لیتری و پلی اتیلنی ۵۰۰ میلی لیتری



(SULFADIAZINE+ TRIMETHOPRIM) 48%

(سولفادiazین + تری متوپریم) ۴۸٪

ORAL SUSPENSION

سوسپانسیون خوراکی



شرکت داروسازی کیمیا فام، فرمانیه، ابتدای دیباجی شمالی، پلاک ۶۲

تلفن: ۶۰ - ۲۲۸۲۴۶۵۷ فاکس: ۲۲۸۱۵۸۱۷

www.kimiafaam.com

