

## ترکیب:

هر میلی لیتر از محصول حاوی ۹۶ میلی گرم آمپرولیوم فعال معادل با ۱۰۸/۶ میلی گرم آمپرولیوم هیدروکلراید می باشد.

## مکانیسم اثر:

آمپرولیوم به علت شباهت ساختمانی با تیامین توسط آیمیریا مورد استفاده قرار گرفته و بدینوسیله در ۳ روز اول چرخه زندگی آیمیریا سبب اختلال در متابولیسم تک یاخته می شود. آمپرولیوم بیشترین اثر را در سه روز اول چرخه زندگی آیمیریا داشته و بر روی مروزوایتها و سایر مراحل چرخه زندگی آیمیریا اثر دارد.

## گونه هدف:

طیور (گوشتی، مادر، تخمگذار) و بوقلمون

## موارد مصرف:

کیمیا آمپرولیوم - اس جهت پیشگیری و درمان بیماری کوکسیدیوز طیور مورد استفاده قرار می گیرد.

## مقدار و روش مصرف:

۵۰۰-۲۵۰ میلی لیتر در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۵ روز و درمان را به مدت ۱-۲ هفته (۱۲۵ میلی لیتر در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی) ادامه دهید.

• این محلول به عنوان تنها منبع آب آشامیدنی در طول دوره درمان توصیه می شود.  
توجه: مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و بهتر است با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

## موارد منع مصرف: ندارد

## زمان پرهیز از مصرف:

طیور: ندارد

## موارد احتیاط:

پس از باز شدن درب بطری، محتویات در مدت ۲ ماه باید مصرف گردد.  
محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا ۲۴ ساعت باید مصرف شود..


**شرایط نگهداری:** در جای خشک، دردمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت گردد.

بسته بندی: بطری های پلی اتیلنی ۲۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ میلی لیتری به همراه لیوان مدرج



AMPROLIUM 9.6%  
ORAL SOLUTION

آمپرولیوم ۹/۶٪  
محلول خوراکی



شرکت داروسازی کیمیفام ، فرمانیه ، ابتدای دیباجی شمالی ، پلاک ۶۲

تلفن : ۶۰ - ۲۲۸۲۴۶۵۷ فاکس : ۲۲۸۱۵۸۱۷

[www.kimiafaam.com](http://www.kimiafaam.com)

