

ترکیب

هر کیلوگرم پرمیکس کیمیا موننسنین 10[®] حاوی 100 گرم موننسنین سدیم می باشد.

مکانیسم اثر

کیمیا موننسنین 10[®] یک کوکسیدیواستات یونفور است که به علت توانایی اتصال به یونهای فلزات یک ظرفیتی مثل سدیم و پتاسیم، کمپلکس های یونی قابل حل در چربی را تشکیل می دهد که با افزایش نفوذپذیری غشای سلولی انگل به یونهای فوق موجب بهم زدن تعادل یونی در دو طرف غشای انگل می گردد. موننسنین با اختلال در پمپ سدیم - پتاسیم و افزایش ورود سدیم به داخل سلول باعث افزایش فشار اسمزی و جذب آب به داخل سلول و مختل نمودن اعمال میتوکندریایی (اکسیداسیون و هیدرولیز ATP) و در نتیجه تورم و انهدام انگل می شود. همچنین موننسنین نسبت به سایر یونفورها باعث کاهش دفع آب در طیور و مانع از افزایش رطوبت بستر می گردد.

گونه هدف

طیور (گوشتی، نیمچه تخمگذار، بوقلمون پرواری)

موارد مصرف

برای پیشگیری و کنترل از کوکسیدیوز ناشی از گونه های مختلف آیمریا شامل آسرولینا، نکاتریکس، میواتی، تنلا، ماکزیما و بونتی در تمام دوره پرورش جوجه های گوشتی و نیمچه های تخمگذار و گونه های آیمریا گالوپاوونیس، مله آگریمیتیس و آدنوئیدس در بوقلمون های پرواری تا سن 16 هفتگی مورد مصرف قرار می گیرد.

مقدار و روش مصرف

جوجه های گوشتی و نیمچه های تخمگذار: 1200 - 1000 گرم پرمیکس کیمیا موننسنین 10[®] در یک تن دان (از یک روزگی تا 3 روز قبل از کشتار در جوجه های گوشتی و در نیمچه تخمگذار حداکثر تا 16 هفتگی).
بوقلمون های پرواری: 1000 - 900 گرم پرمیکس کیمیا موننسنین 10[®] در هر تن دان حداکثر تا سن 16 هفتگی.

موارد منع مصرف

مصرف این دارو در اسب یا سایر تک سمی ها مجاز نمی باشد. این دارو نباید با سایر کوکسیدیواستاتها مخلوط شود. موننسنین در مرغها و بوقلمونهای تخمگذار (در زمان تخمگذاری) منع مصرف دارد.

تداخلات دارویی

از مصرف همزمان با سایر ضد کوکسیدیوزها، تیمولین، اریترومایسین، کلرامفنیکل و سولفانامیدها خودداری نمایید.

زمان پرهیز از مصرف

مصرف دارو 3 روز قبل از کشتار طیور قطع شود.

موارد احتیاط:

پس از باز شدن بسته بندی حداکثر ظرف مدت 2 ماه مصرف گردد.
داروی آماده مصرف را حداکثر ظرف مدت 24 ساعت مصرف نمایند.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای کمتر از 25 درجه و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی

پاکت های فویل آلومینیومی چند لایه 1000 و 5000 گرمی بصورت وکیوم

MONENSIN 10%

مونسنین 10%

FEED ADDITIVE PREMIX

پرمیکس افزودنی به دان



شرکت داروسازی کیمیا فام، فرمانیه، ابتدای دیباجی شمالی، پلاک 62
تلفن : 60 - 22824657 فاکس : 22815817

www.kimiafaam.com

